

KRAP (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758)

črnomorsko in jadransko povodje

domorodna vrsta

E - ogrožena vrsta

Krap zraste 25–75 cm, največ do 120 cm. Divji krap ima vretenasto, rahlo bočno stisnjeno telo. Gojeni krap nastopa v številnih pasmah, od takih popolnoma brez lusk prek vseh vmesnih oblik do takih, ki imajo vse telo pokrito z luskami. Trup je precej višji kot pri naravni obliki. Na glavi ima zelo velika, končna usta s štirimi brki in mesnatimi ustnicami. Hrbtina plavut je zelo dolga. Predrepna je zelo visoka. Barva telesa se prilagaja okolju. Hrbet je temnejši, modrikasto zelen, boki so rumenkasti do zelenkasti, trebuh je bel do rumen. Vzdolž pobočnice se pojavljajo temnejše pege.

Živi v mirnejših globljih stoječih ali tekočih vodah z mehkim, zarastlinjenim dnom. Zimo preživi zviti v blatno dno. Divji krap se seli po rekah na dolge razdalje.

Samci spolno dozorevajo v tretjem do šestem, samice pa v četrtem do šestem letu. Drsti se od maja do junija. Spolno zreli osebki se selijo v rečne rokave in na poplavne predele na drst. Samica odloži na rastlinje od 300.000 do 750.000 drobnih, lepljivih iker. Je rastlinojedenec, hrani se z ostanki rastlin, toda tudi z manjšimi nevretenčarji.

Prvotno je naseljeval Azijo od reke Amur do Junana in segal do Črnega, Kaspijskega, Azovskega in Aralskega morja. V preteklosti se je selil po porečju Donave in danes naseljuje vso Evropo. V Sloveniji živi v srednjih tokovih Save, Mure, Drave, redko v njihovih večjih pritokih. Gojeno obliko najdemo v skoraj vsaki stoječi in tekoči vodi.

Divja oblika krapa je danes ena najbolj ogroženih rib v Evropi. Glavni vzrok za upadanje so regulacije, zaradi katerih so uničena drstišča. Varstveni ukrep je naseljevanje gojenih oblik, kar pa je z naravovarstvenega stališča prej negativno kot pozitivno. Divji krap je in bo še bolj ogrožen.

Zavarovan je z lovno mero, lovopustom in predpisanim uplenom. Učinkovito varstvo divjega krapa je mogoče le z osnovanjem rezervatov in z uvedbo večje lovne mere, najmanj 45 cm, ker je takrat samica res spolno zrela.

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

Povodje Slovenije: jadransko, donavsko

Čas drsti: maj–junij

Število iker: 300.000–750.000

Spolna zrelost: samec 3–6 let, samica 4–6 let

Velikost: 25–75 cm, največ 120 cm

Rdeči seznam: E – ogrožen divji krap

Status vrste: domoroden donavsko, naseljen jadransko

Selitev: dolge selitve

Vir: Povž, M., Gregori, A. & Gregori, M. (2015). *Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji*, Ljubljana: Zavod Umbra – Formatisk. Uporabljeno z dovoljenjem avtorjev Andreja in Marije Gregori

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) ter sredstev Republike Slovenije. Organ upravljanja za izvajanje Programa ESPRA 2021–2027 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.



Sofinancira
Evropska unija



LASR
lokalna akcijska skupina
za ribištvo Savinjske regije



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO